



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期/思春期								
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	
インフルエンザ菌b型(ヒブ)	不活化			①	②	③					④(注1)													
肺炎球菌(PCV13)	不活化			①	②	③					④	(注2)												
B型肝炎	ユニバーサル			①	②					③		(注3)												
	母子感染予防	①	②							③														
ロタウイルス	1価			①	②					(注4)														
	5価			①	②	③				(注5)														
4種混合(DPT-IPV)	不活化			①	②					③	④(注6)				(7.5歳まで)									
3種混合(DPT)	不活化			①	②					③	④(注6)				(7.5歳まで)									
2種混合(DT)	不活化																				⑥11-12歳 (注8)			
																						①11歳	12歳	
ポリオ(IPV)	不活化			①	②					③	④(注6)				(7.5歳まで)									
BCG	生									①														
麻疹・風疹混合(MR)	生																							
水痘	生																							
おたふくかぜ	生																							
日本脳炎	不活化																							
インフルエンザ	不活化																							
ヒトパピローマウイルス(HPV)	不活化																							
																					(注13)	小6	中1 ①②③(注14)	中2~ 高1

定期接種の推奨期間
  定期接種の接種可能な期間
  任意接種の推奨期間
  任意接種の接種可能な期間
  添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
  健康保険での接種時期