



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期									
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上		
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	不活化			①	②	③						④ (注1)													
肺炎球菌 (PCV13)	不活化			①	②	③						④											(注2)		
B型肝炎	ユニバーサル			①	②						③												(注3)		
	母子感染予防	①	②								③														
ロタウイルス	1価			①	②					(注4)															
	5価			①	②	③				(注5)															
4種混合 (DPT-IPV)	不活化			①	②					③		④ (注6)					(7.5歳まで)								
3種混合 (DPT)	不活化			①	②					③		④ (注6)					(7.5歳まで)								
2種混合 (DT)	不活化																					⑥11-12歳 (注8)			
																						11歳 ①	12歳		
ポリオ (IPV)	不活化			①	②					③		④ (注6)					(7.5歳まで)								
																	⑤ (注9)								
BCG	生									①															
麻疹・風疹混合 (MR)	生												①									② (注10)			
水痘	生											①		②									(注11)		
おたふくかぜ	生											①										② (注12)			
日本脳炎	不活化													①	②	③	(7.5歳まで)					④9-12歳			
インフルエンザ	不活化																						毎年 (10、11月などに) ①②	13歳より①	
ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化																					(注13)	小6	中1 ①②③ (注14)	中2～高1

定期接種の推奨期間
定期接種の接種可能な期間
任意接種の推奨期間
任意接種の接種可能な期間
添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
健康保険での接種時期