



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期/思春期										
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上			
インフルエンザ菌b型(ヒブ)	不活化			①	②	③					④(注1)															
肺炎球菌(PCV13)	不活化			①	②	③					④												(注2)			
B型肝炎	ユニバーサル	不活化		①	②					③													(注3)			
	母子感染予防	不活化	①	②						③																
ロタウイルス	1価	生		①	②					(注4)																
	5価	生		①	②	③				(注5)																
4種混合(DPT-IPV)	不活化			①	②	③					④(注6)					(7.5歳まで)										
3種混合(DPT)	不活化			①	②	③					④(注6)					(7.5歳まで)										
2種混合(DT)	不活化																					⑥11-12歳(注8)	11歳①	12歳		
ポリオ(IPV)	不活化			①	②	③					④(注6)					(7.5歳まで)										
BCG	生									①																
麻疹・風疹混合(MR)	生																②(注10)									
水痘	生												①		②									(注11)		
おたふくかぜ	生																	②(注12)								
日本脳炎	不活化														①	②	③(7.5歳まで)					④9-12歳				
インフルエンザ	不活化																							毎年(10、11月などに)①②	13歳より①	
ヒトパピローマウイルス(HPV)	2価,4価	不活化																				(注13)	小6	中1①②③(注14)	中2~高1	(注15)
	9価	不活化																				(注13)	小6	中1①②(注14)	中2~高1	(注15)

  定期接種の推奨期間
   定期接種の接種可能な期間
   任意接種の推奨期間
   任意接種の接種可能な期間
   添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
   健康保険での接種時期